

S02 · Parametri dell'adulto: le soglie da comunicare

Parametro	Normale	Comunica
FR	12-20/min	sotto 10 o sopra 20 · sopra 30 o sotto 8 grave
FC	60-100/min	sotto 60 o sopra 100, con ritmo e ampiezza
PA	ottimale sotto 120/70	da 140/90 · PAS sotto 90 · PAS sopra 180 o PAD sopra 110 subito
SpO ₂	94-98% (BPCO 88-92%)	sotto 94% → ossigeno (S08)
Temperatura	fino a 37 °C sulla pelle (37,5 interna)	oltre: febbre · sotto 35 °C ipotermia
Coscienza	A orientato, GCS 15	confusione nuova, V, P, U · GCS 8 o meno subito
Riempimento capillare	fino a 3 s	oltre 3 s

- FR sotto 8 con polso → ventila con pallone, reservoir e ossigeno
- Polso radiale presente ≈ PAS sopra 80 · solo carotideo ≈ sopra 60: indicativo, **non sostituisce la misura**
- Febbre con coscienza alterata → comunica subito · dopo caldo o sforzo, coscienza alterata o sopra 40 °C → **colpo di calore**: raffredda e SOREU subito
- Di' sempre se la SpO₂ è **in aria o in ossigeno**, e l'ora della misura

